

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST - Arras - Tél. 23.14

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Alertes Agricoles d'ARRAS.
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

N° LXXI - Août 1966

INFORMATIONS

MILDIOU

POMMES DE TERRE

Les conseils donnés dans notre note précédente restent valables.

Seul, reste posé actuellement le problème des cultures bien protégées jusqu'à présent et dont la végétation est presque indemne.

Il paraît prudent de conserver une cadence hebdomadaire chaque fois que l'on désire prolonger la protection du feuillage (traitements tous les 7 jours).

Mais afin de ne pas courir trop de risques de contamination des tubercules, il paraît sage de défaner chimiquement avant le 5 août les cultures de Bintje plantées avant Pâques et de ne pas prolonger après le 15 août, Les cultures plantées fin-avril, ni après le 20 août celles plantées début-mai. Dans tous les cas, le défanage doit être entrepris 5 jours après le dernier traitement.

- REMARQUES** - I - Le défanage mécanique (rotafane, etc...) peut être très dangereux s'il n'est pas précédé d'un défanage chimique efficace.
- II - Les produits généralement employés pour le défanage sont le chlorate de soude (15 à 20 Kgrs par hectare en fonction des terres), les colorants nitrés en mélange avec le gas-oil et le diquat (doses du fabricant).
- III - Chaque fois que cela est possible, procéder à l'arrachage par temps sec afin d'éviter les contaminations de tubercules le jour même de l'arrachage.

TAVELURES ET MALADIES DE CONSERVATION

CULTURES FRUITIÈRES

La pluviométrie incessante de l'été fait que la protection contre la tavelure doit se poursuivre dans la plupart des vergers jusqu'à la récolte. Un programme minimum de 3 traitements appliqués vers le 10 août, le 30 août et le 20 septembre paraît nécessaire pour les pommes tardives - (Golden par exemple). L'emploi d'un produit polyvalent tel que le Captane ou le Phaltane est souvent conseillé pour lutter à la fois contre les maladies de conservation du type Gloesporium.

REMARQUES - Dans certains vergers, la Tordeuse de la Pelure (*Capua reticulana*) poursuit ses ravages. Surveiller les éclosions de chenilles pour intervenir sur toutes jeunes chenilles avec un insecticide contact.

CERCOSPORIOSE

BETTERAVES

La végétation des betteraves est souvent très forte et sauf exception, les dégâts de Cercosporiose ne semblent pas très graves jusqu'à présent. Surveiller cependant les cultures et intervenir rapidement si de petits foyers de la maladie apparaissent avant le 15 août.

R A P P E L - GRAISSE ET ANTHRACNOSE SUR HARICOTS.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

R. DIVOUX

P. COUTURIER